































## Zusammenstellung der Unterschiede des männlichen Genitalapparats von Oxyptilus-Arten

(Zusammenstellung: Monika Weithmann, Fotos: Klaus Schwabe)

Bezeichnung	pilosellae	chrysoactyla	parvidactyla	distans	tristis
					
Tegumenarme	 <p>rund spitz</p> <p>gerade, dick, Spitze oben flacher gerundet, unten eckiger, genauso lang wie V1</p>	 <p>gerade</p> <p>gerade, dick, deutlich länger als V1</p>	 <p>rund</p> <p>gerade, Spitze dünn, genauso lang wie Valva</p>	 <p>leicht gebogen schräg</p> <p>leicht gebogen, deutlich länger als V1</p>	 <p>gerade Ecke</p> <p>gerade, sehr dick, länger als V1</p>
Uncus					
	Form ähnlich parvidactyla, ist hier zusammengefaltet; sonst rechteckig; länger als breit, kürzer wie Tegumenmitte	Form ähnlich parvidactyla, ist hier zusammengefaltet; länger als breit, genauso lang wie Tegumenmitte	länger als breit, länger als Tegumenmitte	rund, länger als breit, genauso lang wie Tegumenmitte	rund, kürzer als breit; deutlich kürzer als Tegumenmitte
Valva V1=(Valva-Valvula)		 <p>spitz Kerbe</p>		 <p>spitz Kerbe</p>	 <p>rund rund gerade</p>
	Valvula ca.45% von Valva (100%), länglich, eher mittig, V1 gerade	Valvula ca.40% von Valva (100%), spitz und breit, leicht versetzt, V1 rund mit Kerbe	Valvula ca.20% von Valva (100%), eher rundlich und unterhalb angewachsen, V1 rund	Valvula ca.50% von Valva (100%), spitz und sehr lang, V1 rund mit Kerbe	Valvula ca.43% von Valva (100%), rund und lang, V1 rund ohne Kerbe
Bezeichnung	pilosellae	chrysoactyla	parvidactyla	distans	tristis
Saccusanhänge (Längen können variieren)		 <p>←→</p>	 <p>seitlich</p>		
	fast genauso lang wie Tegumenmitte; zusammen mit Steg	Gefaltet, viereckig oben, zusammengewachsen	Nach oben gebogen, lang	Getrennt, genauso lang oder länger als 50% von V1	Getrennt, deutlich kürzer als 50% von V1
Phallus (Aedeagus)	 <p>ohne</p>	 <p>mit</p>	 <p>ohne</p>	 <p>mit</p>	 <p>mit</p>
Faltergröße (mm)	15-21	15-21	13-18	15-22	14-19
Futterpflanze	Hieracium pilosella	Hieracium spec., Picris hieracioides	Hieracium spec.	Crepis spec., Hieracium spec., Picris hieracioides	Hieracium spec.,
Flugzeit	Mai-August	Juni-August	Mai-Juli	April-Juni; Juli-September (zwei Generationen)	Juni-August (zwei Generationen)